

РЕЗУЛЬТАТ РАБОТЫ



ДЛЯ ЗАМЕТОК

Чтобы узнать больше о процедуре,
отсканируйте QR-код



г. Москва, Большой
Лёвшинский переулок, 6с1
+7 (495) 646-87-89, estelab.ru



ЭСТЕЛАБ
СТАНЬ КЕМ ХОЧЕШЬ



Памятка после процедуры

ЛАЗЕР PICOSURE
ОМОЛОЖЕНИЕ,
УДАЛЕНИЕ ПИГМЕНТАЦИИ

Уникальная методика работы с пигментацией, татуажем, татуировками, мелазмой и омоложением разработана в США компанией Synosure более 10 лет назад. Аппарат получил одобрение FDA и прошёл тысячи клинических исследований.

Воздействие на кожу осуществляется благодаря фотомеханическому эффекту. Он обеспечивает не только удаление пигмента, но и активную выработку коллагена и эластина, низкие болевые ощущения, время проведения процедуры от 20 до 60 минут, реабилитация в зависимости от интенсивности воздействия от 1 до 24 часов.

ПОКАЗАНИЯ К ПРОЦЕДУРЕ

- Удаление пигментных пятен различной этиологии
- Лечение мелазмы
- Омоложение кожи
- Лечение стрий, рубцов и растяжек

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРОЦЕДУРЕ

- Беременность и период лактации
- Онкология (процедура возможна по истечении 5 лет после снятия с учета онкологического диспансера)
- Обострение хронических заболеваний
- Острые респираторные вирусные инфекции
- Нарушение целостности кожных покровов
- Заболевания крови в анамнезе
- Склонность к образованию келоидных рубцов
- Психические расстройства, эпилепсия
- Герпетические высыпания
- Загар



ПОДГОТОВКА К ПРОЦЕДУРЕ

Необходимо исключить нахождение под открытыми солнечными лучами за 2 недели до планируемой даты процедуры.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ

1. Исключить контакт с водой в течение 24 часов
2. Исключить механическое воздействие в области проведения манипуляции
3. Обрабатывать зону водным раствором хлоргексидина или мирамистином 3 раза в день в течение 7 дней
4. Наносить траумель 3 раза в день в течение 7 дней
5. Исключить посещение бань, саун в течение 14 дней
6. Не рекомендуется находиться под открытыми солнечными лучами в течение 14 дней после процедуры, использовать крем с SPF не менее 50
7. При возникновении аллергической реакции рекомендуется прием антигистаминных препаратов (внутри: Ксезал, Зодак, Зиртек, Супрастин) и нанесение глюкокортикоидных мазей (наружно: Целестодерм)
8. Исключить использование средств, содержащих кислоты, энзимные частицы, агрессивные компоненты